Table 3. Turfgrass tolerance to postemergence herbicides (cont)

Postemergence Herbicides	St. Augustinegrass	Perennial ryegrass	Tall fescue	Zoysiagrass
asulam	I	D	D	D
atrazine	T	D	D	I
bentazon	T	T	T	T
bromoxynil	T	T	T	T
chlorflurenol	T	T	T	T
chlorsulfuron	D	D	D	D
clopyralid	D	T	T	I-T
2,4-D	D-I	T	T	T
2,4 + dicamba	D-I	I*	T	T
2,4-D + dichlorprop	D-I	I*	T	T
2,4-D + mecoprop (MCPP)	D-I	I*	T	T
2,4-D + MCPP + dicamba	D-I	I*	T	T
2,4-D + triclopyr	D	I*	T	D
dicamba	D-I	T	T	T
DSMA, MSMA	D	I	I-T	I
fenoxaprop	D	T	T	I
imazaquin	T	D	D	T
MCPP	D-I	T	T	T
metsulfuron	I-T	D	I-T	I
metribuzin	D	D	D	D
pronamide	D	D	D	D
quinclorac	D	T	T	T
sethoxydim	D	D	D	I
simazine	T	D	D	I

[1]T = Tolerant at labeled rates; I = Intermediate tolerance, use at reduced label rates; D = Damaging, do not use this herbicide or it is not registered for use on this turfgrass

*Tolerance depends on specific product formulation, timing of its application and its applied rates